

# Ponstin®

## IBUPROFENO

Suspensión oral  
**Uso pediátrico**

**Analgésico / Antifebril / Antiinflamatorio**

Industria Argentina  
Venta Libre

### **Fórmula:**

Cada 100 mL de suspensión oral contiene: Ibuprofeno 6 g.  
Excipientes: goma xántica, ácido cítrico, benzoato de sodio, polisorbato 80, glicerina, sacarina sódica, color FD&C rojo 40, sorbitol, sabor frutilla, agua purificada.

### **Acción terapéutica:**

Analgésico – Antifebril – Antiinflamatorio.

### **Uso del medicamento:**

Lea detenidamente este folleto. Uso pediátrico.  
Ponstin® está indicado para el alivio temporario de la fiebre, dolores de garganta, dientes y de cabeza, para resfrios y estados gripales que se acompañan de fiebre y/o mal estado general.

### **Cómo usar este medicamento:**

Administrar Ponstin® Pediátrico de acuerdo con las indicaciones de la siguiente tabla.

Peso (kilos)	Edad (años)	Dosis (ml)
Menos de 11	Menos de 2	Consulte a su médico
11 a 15	2 a 3	5 ml
16 a 21	4 a 5	7,5 ml
21 a 27	6 a 8	10 ml
27 a 32	9 a 10	12,5 ml
Más de 32	Más de 10	15 ml

Es preferible establecer la dosis de acuerdo al peso del niño, de no ser posible tomar como referencia la edad.  
En aquellos niños con problemas gástricos se recomienda ingerir el producto con las comidas.  
En caso necesario repetir la dosis cada 8 horas.  
No administrar más de 3 veces al día.

### **Contraindicaciones:**

Hipersensibilidad a cualquier componente de la fórmula.  
No utilizar si el niño es alérgico al ibuprofeno, aspirina u otros antiinflamatorios.

### **Precauciones:**

Consulte con su médico en estos casos:  
- El niño se encuentra bajo atención médica por un cuadro clínico severo o está recibiendo cualquier otra medicación, presenta problemas o efectos adversos severos al emplear antiérgicos o antiérgicos, no obtiene alivio de los síntomas en el término de un día de tratamiento, o el dolor y/o la fiebre empeoran.  
- Si está deshidratado (pérdida de mucho líquido) debido a vómitos, diarrea o falta de ingesta de líquidos.  
- En el área dolorida hay enrojecimiento o tumefacción.  
- El dolor de garganta es severo, se presenta con dolor de cabeza, fiebre, erupción, náuseas y/o vómitos. Si el dolor de garganta dura más de 2 días con igual intensidad.  
- Aparecen síntomas nuevos.  
Aunque el ibuprofeno posee las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, nunca deben administrarse juntos. En esta eventualidad consulte con su médico.

**Si Ud. está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.**

### **Advertencias:**

Salvo indicación médica:  
- No combinarlo con otros productos analgésicos y/o antiérgicos.  
- No usar durante más de 3 días para aliviar la fiebre y/o el dolor.  
- No utilizar contra el dolor de estómago.

### **Reacciones adversas:**

En algunos pacientes pueden ocurrir trastornos gastrointestinales (náuseas, vómitos, gastralgias, dispepsia), rash cutáneo, trastornos respiratorios (en los pacientes alérgicos a la aspirina), vértigos y cefalea. Raramente, el tratamiento puede producir aumento de las transaminasas, oliguria (retención de orina) y/o agranulocitosis.

**Mantener este medicamento, como cualquier otro, fuera del alcance de los niños.**

**Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico.**

### **Sobredosis:**

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:  
- Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-6666/2247.  
- Hospital Dr. Alejandro Posadas. Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.  
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata. Tel.: (0221) 451-5555.  
- Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.: 0800-3330160.  
Para otras consultas: Centro de atención telefónica de Lab. Elea  
**0800-333-3532.**

### **Presentaciones:**

Envases conteniendo 100 mL.

### **Agitar antes de usar.**

**Conservar entre 15 y 30°C, en el envase perfectamente cerrado. No congelar.**

Especialidad Medicinal autorizada por el M. S. Cert. N° 40.587.  
Elaborado por Laboratorio Elea S.A.C.I.F. y A. Sanabria 2353, CABA.  
Bajo licencia exclusiva de Warner Lambert Co, U.S.A.  
Director Técnico: Fernando G. Tonegozzo, Farmacéutico.  
Última revisión: Junio 2007.  
503529-00 1-pm-g

Bajo Licencia W.L.

